

حشره کش تماسی-گوارشی
با مقدار مصرف اندک و تاثیر بیشتر
در کنترل آفات

RUBI[®] 100 SC



روبی حشره کشی با نحوه اثر تماسی - گوارشی و خاصیت ضربه ای که با مصرف میزان اندک، آفات هدف را کنترل می نماید.

نوع و میزان ماده موثره و فرمولاسیون: آلفاسایپر مترین ۱۰ % SC

نحوه اثر: آلفا سایپر مترین از جمله سموم پایرئتروئیدی است که با اثر بر روی سیستم عصبی محیطی و مرکزی حشرات و قطع نفوذ پذیری غشای سلول های عصبی نسبت به یون سدیم موجب عدم تحریک پذیری این سیستم و در نهایت از بین رفتن آفات می گردد.

مزایا:

- مصرف مقدار کمتر آفت کش در واحد سطح
- اثر ضربه ای در کنترل آفات
- توانایی کنترل طیف وسیعی از آفات
- عدم وجود باقی مانده در محصول نهایی پس از برداشت در صورت مصرف طعمه مسموم
- قابلیت اختلاط با اغلب حشره کش های گروه فسفره آلی
- موثر در کنترل طیف وسیعی از آفات بهداشتی (مگس و پشه) و دام پزشکی (پارازیت های خارجی)





ثبت در ایران

میزان مصرف	آفت هدف	محصول
۱۰۰ میلی لیتر در هکتار به صورت طعمه‌ی مسموم	کرم طوقه بر Agrotis	چغندر قند

طریقه آماده سازی طعمه: ابتدا مقدار ۱۰۰ میلی لیتر روبی را در ۵۰ لیتر آب حل نمایید و سپس مقدار ۸۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم سبوس گندم را به محلول بدست آمده اضافه نمایید تا طعمه مطلوب بدست آید.

موارد مصرف در سایر کشورها

آفت	محصول
شته های غلات، سن های غلات	گندم و جو
کک کلزا، سفیده کلم، بیید کلم، پروانه پشت الماسی، هلیوتیس	کلم و کلزا
کرم برگ خوار، هلیوتیس، کرم طوقه بر	حبوبات
کرم غوزه، سن پنبه، کرم های برگ خوار	پنبه
هلیوتیس، کرم طوقه بر، کرم ساقه خوار	ذرت و سورگم
کرم برگ خوار - کرم میوه خوار گوجه فرنگی	گوجه فرنگی
بیید سیب زمینی، کرم برگ خوار، کرم مفتولی	سیب زمینی
کرم های برگ خوار	یونجه و گیاهان علوفه ای
زنجره	نیشکر
مگس زیتون	زیتون
کرم های میوه، سرخرطومی ها، کرم سیب	درختان میوه

مدیریت کاربرد:

- طعمه پاشی در ساعات عصر و نزدیک غروب صورت گیرد.
- از مصرف بیش از ۲ بار در هر فصل زراعی (به غیر از پنبه) اجتناب گردد.
- در صورت تمایل به سم پاشی باروبی، حداقل تا ۲۴ ساعت از ورود به محل سم پاشی شده خودداری فرمایید.
- از اختلاط با هر نوع روغن، ادجوانت و یا مواد کاهنده کنش سطحی با این محصول خودداری شود.

