

فاکورات

برای انسان و دام فوق العاده خطرناک است.

دور از دسترس و دید کودکان قرار دهید.

محتویات: هر 1000 گرم از طعمه مسموم آماده مصرف، حاوی 5/0 گرم ماده مؤثره برودیفاکوم 0/01 گرم ماده تلخ دانتونیم بنزوات و سایر مواد افزودنی خوراکی تا 1000 گرم می‌باشد.

نحوه اثر: ماده مؤثره این محصول متعلق به نسل دوم مواد ضد انعقادی بوده و با خوردن حتی یک دز (Dose) آن توسط آفات هدف، مرگ ناشی از خونریزی داخلی رخ می‌دهد. فاکورات طعمه آماده مصرفی است که مخلوط متناسبی از سم، مواد خوراکی، مواد جاذب و جلب کننده موش‌ها بوده و جهت مبارزه با گونه‌های مختلف جوندگان مانند موش‌های خانگی، صحرایی و انباری توصیه می‌شود. آنتی‌کواگولانت‌ها بازدارنده چرخه K₁ و باعث عدم انعقاد خون و خونریزی شدید می‌باشند.

مدیریت کاربرد: طعمه مسموم را در داخل یا نزدیک به لانه فعال و یا در مسیر حرکت و محل تغذیه موش‌ها کارگذاری نمایید. طعمه را در داخل کارتن‌هایی به ابعاد 10*12 سانتیمتر و یا در ایستگاه‌ها و جعبه‌های مخصوص طعمه‌گذاری به مقدار نیاز کارسازی نمایید. محل طعمه‌گذاری بطور مستمر مورد بازبینی قرار گرفته و طعمه‌های مصرف شده بلافاصله جایگزین شود.

درجه خطر سم: 1a (فوق العاده خطرناک)

پادزهر: ویتامین K₁

سمیت خوراکی برای موش (LD₅₀): 0.4 mg/kg

شرایط نگهداری: در بسته بندی اصلی در محل خشک و در دمای پایین‌تر از 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

مقدار مصرف

مقدار مصرف	نوع جونده
20 گرم در هر لانه	موش ورامین (بزرگ)
10 گرم در هر لانه	موش مغان (کوچک)

دوره کارنس: تاکنون هیچ دوره کارنسی برای این محصول ثبت نشده است.

راهنمای مصرف آفتکش: به منظور کاربرد این طعمه در مزارع و باغات، ابتدا کلیه حفره‌ها را مسدود نمایید و پس از گذشت 24 ساعت، اقدام به طعمه‌گذاری در حفره‌های فعال نمایید.

احتیاطات لازم و ایمنی مصرف:

- از برخورد با پوست دست و خصوصاً اندام مخاطدار جلوگیری شود.
- از نگهداری در نزدیکی مواد غذایی و حیوانات اهلی و کودکان جدا جلوگیری کنید.
- در هنگام کار با این محصول از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات پرهیز گردد.
- هنگام طعمه‌گذاری از ماسک و دستکش استفاده شود.
- پس از طعمه‌گذاری دست‌ها با آب و صابون شسته شود.
- دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری گردد.
- به منظور جلوگیری از مسمومیت ثانویه، موش‌های تلف شده جمع‌آوری و با استفاده از تمهیدات بهداشتی دفع شوند.

سمیت برای محیط زیست:

- از مصرف مجدد ظروف و بسته‌های خالی خودداری گردد و بسته‌های خالی در محل مناسب و به دور از منابع آبی نگهداری و مطابق ضوابط مقررات مربوطه نسبت به دفع زیست محیطی آنها اقدام نمایید.

تحت نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.

ثبت‌نام و نشانی خریدار و میزان سم فروخته شده با ذکر تاریخ در دفاتر مربوطه توسط فروشنده الزامی است.

علایم مسمومیت: خونریزی داخلی.

کمک‌های اولیه: در صورت خوردن سم، بلافاصله محتویات معده فرد مسموم تخلیه و به پزشک مراجعه گردد. در صورت تماس با پوست، محل تماس را با آب و صابون بشویید. در صورت تماس با چشم، چشم را با آب پاکیزه چندین بار شستشو دهید.