

برنامه تغذیه محلول پاشی توت فرنگی				
ردیف	زمان مصرف	توصیه کودی	دوز مصرف	توضیحات
1	قبل از انتقال نشاء	ترانوکس مگامین آلسیگول توتال مگاسی بیو 20 گلد	100 تا 150 گرم در 100 لیتر 0.5 تا 1.5 کیلوگرم در هزار لیتر 3 لیتر در هزار 400 تا 500 گرم در هزار 2 تا 2.5 لیتر در هزار	تسریع رشد اولیه و جلوگیری از تنش های محیطی
2	بعد از انتقال نشاء	مگاکاپ مگاپیک اگریفوس بوستر روی مولیبدن* ¹	1 تا 1.5 لیتر در هزار 1.5 تا 2.5 لیتر در هزار 1 تا 2 لیتر در هزار 1 تا 2 لیتر در هکتار	تسریع رشد ریشه ، بهبود سلامت گیاه و پیشگیری از پوسیدگی و بیماری های قارچی
3	مراحل ابتدایی رشد بوته	نوامگ مولتی مگامیکس استند SKH* ² بیو 20 گلد	3 تا 5 کیلوگرم در هکتار 0.5 تا 1 کیلوگرم در هکتار 2 تا 3 لیتر در هکتار 2 تا 2.5 لیتر در هزار	بهبود رشد بوته ها
4	رشد و توسعه بوته	آهن مگافر بوروزینک بادمیت* ³ مگازپ ترانوکس بومو امکس* ⁴	1 کیلوگرم در هکتار 3 کیلوگرم در هکتار 2 تا 4 لیتر در هکتار 1 تا 2 لیتر در هکتار 100 تا 150 گرم در 100 لیتر 2 لیتر در هکتار	تقویت عمومی بوته جلوگیری از بیماری های قارچی و بهبود و افزایش گلدهی
5	گلدهی	کامپلت ZMC نوامگ مولتی مکسی فروت* ⁵ کالمکس گلد بومو امکس	0.5 تا 1 کیلوگرم در هکتار 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار 4 تا 5 لیتر در هکتار 1 تا 3 لیتر در هکتار 2 لیتر در هکتار	لقاح و باروری بهتر

افزایش سایز و طعم گیری بهتر میوه ممانعت از ریزش میوه و افزایش مقاومت در دوران باردهی	2.5 لیتر در هکتار 2 تا 4 لیتر در هکتار 2 تا 4 لیتر در هکتار	سوپاکل بور *6 بادمیت انهنس KCS *7	ابتدای تشکیل میوه	6
افزایش سایز و طعم و رنگ میوه و پیشگیری از بیماری های قارچی	3 لیتر در هکتار 1.5 تا 2.5 لیتر در هکتار	سیگوکا اکسپرس مگاپیک	طی دوره رشد میوه	7
استحکام بافت میوه و خاصیت انبارداری	3 لیتر در هکتار 1.5 تا 2 لیتر در هکتار 2 تا 3 لیتر در هکتار	سیگوکا اکسپرس Cal 52 سکوئنشپال 2	یک هفته قبل از برداشت	8

*1 : 21 روز بعد از انتقال نشاء محلول پاشی انجام شود.

*2 : یک هفته پس از رشد رویشی و تکرار هر 7 تا 10 روز باشد.

*3 : از دو هفته قبل از تشکیل جوانه گل و در زمان تشکیل میوه هر دو هفته یکبار محلول پاشی انجام شود.

*4 : 2 بار مصرف قبل و بعد از گلدهی استفاده شود.

*5 : از زمان گلدهی هر دو هفته یکبار تکرار شود.

*6 : از ابتدای شکل میوه تا یک هفته قبل از برداشت میوه

*7 : پس از تشکیل میوه هر دو هفته یکبار استفاده شود.

رسام آگری

برنامه تغذیه آبیاری توت فرنگی			
ردیف	زمان مصرف	توصیه کودی	دوز مصرف
1	قبل از کاشت	کود مرغی رسام	5 تا 10 لیتر در هکتار
2	پس از انتقال نشاء	NPK 20.20.20 هیومیک اسید	5 تا 7 کیلوگرم در هکتار 5 لیتر در هکتار
3	قبل از گلدهی و تشکیل میوه	NPK 10.52.10 بوروزینک	2 تا 3 کیلوگرم در هکتار 7 کیلوگرم در هکتار
4	تشکیل میوه	NPK 12.12.36 آهن فرواکتیو آهن مگافر	1 تا 2 کیلوگرم در هکتار 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار

رسام آگری