

برنامه تغذیه محلول پاشی گوجه فرنگی

ردیف	مرحله رشد	توصیه کودی	دوز مصرف	توضیحات
1	2 تا 3 روز قبل از انتقال نشاء	مگاپیک اگریفوس	1.5 تا 2.5 لیتر در هزار 1 تا 2 لیتر در هزار	پیشگیری از بیماری های قارچی
2	پس از اولین آبیاری	آلسیگول توتال مگاسی مگازیپ	3 لیتر در هزار 400 تا 500 گرم در هزار 1 تا 2 لیتر در هزار	توسعه ریشه و بهبود استقرار گیاه و پیشگیری از بیماری های قارچی
3	در طی رشد رویشی (5 برگ اصلی)	بوستر روی مولیبدن مگاکاپ کامپلت ZMC*1	2 تا 3 لیتر در هزار 1 تا 1.5 لیتر در هزار 0.5 تا 1 لیتر در هزار	تحریک و توسعه رشد رویشی بوته و پیشگیری از بیماری های قارچی
4	آغاز مرحله زایشی	کینگ فول روی مگازیپ کامپلت ZMC بیو 20 گلد	0.5 تا 1 لیتر در هکتار 1 تا 2 لیتر در هکتار 0.5 تا 1 لیتر در هکتار 2 تا 2.5 لیتر در هکتار	افزایش گلدهی و تقویت گیاه
5	طی دوره گلدهی	بادمیت*2 کامپلت ZMC فولیار روی کالمکس گلد	1 تا 2 لیتر در هکتار 0.5 تا 1 لیتر در هکتار 3 لیتر در هکتار 1 تا 3 لیتر در هکتار	بهبود تلقیح و پیشگیری از ریزش گل ها
6	پس از تشکیل اولین میوه ها	سیل اکتیو انهنس KCS*3 نوامگ مولتی*4 مکسی فروت*5	1 تا 3 لیتر در هکتار 1.5 تا 2 لیتر هکتار 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار 2 تا 2.5 لیتر در هکتار	افزایش فتوسنتز، تولید و کیفیت میوه و مقاومت به آفات
7	قبل از شروع رنگ گیری میوه	استند SKH انهنس KCS بادمیت سکوئنشیال 2 مگاکاپ	1 تا 1.5 لیتر در هکتار 1.5 تا 2 لیتر در هکتار 1 تا 2 لیتر در هکتار 2 تا 3 لیتر در هکتار 1 تا 1.5 لیتر در هزار	افزایش سایز میوه، بهبود رنگ گیری، استحکام دیواره سلولی و پیشگیری از آفات و بیماری ها

<p>پیشگیری از کمبود عناصر میکرو و آهن درشت شدن میوه افزایش مقاومت بافت و طول عمر انبار داری</p>	<p>0.5 تا 1 کیلوگرم در هکتار 1 کیلوگرم در هکتار 3 لیتر در هکتار 1.5 تا 2 لیتر در هکتار</p>	<p>مگامیکس آهن مگافر سیگو کا اکسپرس Cal 52</p>	<p>8</p> <p>طی دوران رشد میوه تا برداشت</p>
---	--	--	---

*1 : کامپلت ZMC پس از تشکیل 5 برگ اصلی، 10 روز قبل و بعد از گلدهی استفاده شود .

*2 : با آغاز گلدهی در گیاهان به کار رود و هر 10 تا 14 روز یکبار تکرار شود .

*3 : از زمان 4 تا 6 برگی هر 2 تا 3 هفته یکبار میتوان استفاده کرد .

*4 : گوجه فرنگی نیاز زیادی به منیزیم دارد تا بتواند از این ماده برای ساختن کلروفیل و تولید میوه سالم استفاده کند .

*5 : در طول فصل هر 7 تا 10 روز یکبار استفاده شود.

*6 : 4 بار مصرف در طی دوران رشد گیاه با فواصل 14 تا 21 روز

رسام آگری

برنامه تغذیه آبیاری گوجه فرنگی				
ردیف	زمان مصرف	توصیه کودی	دوز مصرف	توضیحات
1	پس از اولین آبیاری	NPK 10.52.10	7 کیلوگرم در هکتار	تقویت ریشه و بهبود استقرار گیاه
2	مراحل ابتدایی رشد بوته	NPK 20.20.20 آهن فرواکتیو	5 تا 7 کیلوگرم در هکتار 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار	تامین کلیه عناصر مورد نیاز گیاه جهت رشد بهتر
3	طی دوران گلدهی	بوروزینک نیترات کلسیم	2 تا 3 کیلوگرم در هکتار 15 تا 20 کیلوگرم در هکتار	بهبود تلقیح و پیشگیری از ریزش گلها
4	طی دوران رشد میوه	NPK 12.12.36 آهن فرواکتیو	12 تا 15 کیلوگرم در هکتار 2 تا 5 کیلوگرم در هکتار	تامین عناصر ماکرو و بهبود رنگ اندازه و کیفیت میوه
5	قبل از شروع رنگ گیری میوه و افزایش سایز میوه	سولوپتاس Cal 52	20 تا 25 کیلوگرم در هکتار 5 تا 7 لیتر در هکتار	افزایش سایز و کیفیت میوه

*نیترات کلسیم هر 10 کیلوگرم معادل 1 لیتر Cal 52 است.

رسام آگری