

برنامه تغذیه محلول پاشی کیوی			
ردیف	زمان مصرف	توصیه کودی	دوز مصرف
1	تورم جوانه	مگاست کامپلت ZMC	0.5 تا 1 تا کیلوگرم در هزار 1 تا 2 لیتر در هکتار
2	قبل از گلدهی	مگامیکس آمینو اسید ترانوکس بوستر روی مولیبدن سوپا کل بور مگازپ	1 تا 2 کیلوگرم در هزار 100 تا 150 گرم در 100 لیتر آب 1 تا 3 لیتر در هکتار 3 تا 4 لیتر در هکتار 1.5 تا 2.5 لیتر در هزار
3	پس از تشکیل میوه	مکسی فروت مگاسی مگاکاپ بادمیت	1 تا 1.5 لیتر در هکتار 400 تا 500 کیلوگرم در هزار 1 تا 1.5 لیتر در هزار 1.5 تا 2.5 لیتر در هکتار
4	افزایش سایز	مگامیکس انهنس KCS	1 تا 2 کیلوگرم در هزار 2 تا 3 لیتر در هکتار
5	رسیدگی و برداشت	سیگو کا اکسپرس کل 52	3 لیتر در هکتار 2 تا 3 لیتر در هکتار
6	بعد از برداشت	مگاست	0.5 تا 1 کیلوگرم در هزار

برنامه تغذیه آبیاری کیوی			
ردیف	زمان مصرف	توصیه کودی	دوز مصرف
1	تورم جوانه	اوره فسفات هیومیک اسید مایع رسام اگریفوس	20 تا 30 کیلوگرم در هکتار 10 تا 20 لیتر در هکتار 2.5 لیتر در هزار
2	قبل از گلدهی	NPK 10.52.10	20 تا 30 کیلوگرم در هکتار
3	پس از تشکیل میوه	NPK 20.20.20 هیومیک اسید مایع رسام آهن فرواکتیو الیگو اکتیو روی پلاس	20 تا 30 کیلوگرم در هکتار 10 تا 20 لیتر در هکتار 30 تا 50 گرم به ازای هر درخت 1.5 تا 3.5 کیلوگرم در هکتار
4	افزایش سایز	NPK 12.12.36 نیترات کلسیم	20 تا 30 کیلوگرم در هکتار 10 تا 20 کیلوگرم در هکتار
5	رسیدگی و برداشت	سولوپتاس نیترات کلسیم	20 تا 30 کیلوگرم در هکتار 10 تا 20 کیلوگرم در هکتار
6	چالکود	کود مرغی رسام	25 لیتر در هکتار

- برای اصلاح آب های سخت و رفع گرفتگی نازل ها استفاده از سوپا لینک توصیه میشود .
- برای افزایش کارایی علف کش ها و قابلیت اختلاط کود ها استفاده از سوپا لینک توصیه میشود .