

برنامه تغذیه محلول پاشی خرما			
ردیف	زمان مصرف	توصیه کودی	دوز مصرف
1	قبل از ظهور گل آذین	مگاست بوستر روی مولیبدن	1 تا 2 کیلوگرم در هزار 1 تا 3 لیتر در هزار
2	دو هفته پس از گرده افشانی	سوپا کل بور	3 تا 4 لیتر در هکتار
3	فندقی شدن میوه	مگامیکس آمینو اسید ترانوکس	0.5 تا 1 کیلوگرم در هکتار 100 تا 150 گرم در 100 لیتر آب
4	یک ماه بعد از فندقی شدن	سوپا کل بور فیسکا روی	1 تا 3 لیتر در هکتار 3 لیتر در هکتار
5	تغییر رنگ میوه	سیگو کا اکسپرس آمینو اسید ترانوکس کو الی کل پرو	3 لیتر در هزار 100 تا 150 گرم در 100 گرم آب 3 لیتر در هکتار
6	قبل از شروع تبدیل به رطب	سیگو کا اکسپرس انهنس KCS	3 لیتر در هکتار 2 تا 3 لیتر در هکتار
7	پس از برداشت	مگاست	1 تا 2 کیلوگرم در هزار

رسام اکری

برنامه تغذیه آبیاری خرما			
ردیف	زمان مصرف	توصیه کودی	دوز مصرف
1	قبل از ظهور گل آذین	هیومیک اسید رسام NPK 15.5.30+2MgO+TE	10 تا 20 لیتر در هکتار 10 تا 20 کیلوگرم در هکتار
2	دو هفته پس از گرده افشانی	NPK 20.20.20+TE	20 تا 30 کیلوگرم در هکتار
3	فندقی شدن میوه	NPK 12.12.36 مگاسید	20 تا 30 کیلوگرم در هکتار 30 تا 40 لیتر در هکتار
4	یک ماه بعد از فندقی شدن	آهن فرو اکتیو الیگو اکتیو روی پلاس سولوپتاس	50 تا 30 گرم به ازای هر درخت 5 تا 10 گرم به ازای هر درخت 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار
5	تغییر رنگ میوه	NPK 12.12.36 نیترا کلسیم	20 تا 30 کیلوگرم در هکتار 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار
6	قبل از شروع تبدیل به رطب	NPK 12.3.43 هیومیک اسید رسام	10 تا 20 کیلوگرم در هکتار 10 تا 20 لیتر در هکتار

- در خاک های شور و قلیایی تکرار مصرف کود های گوگردی و هیومیک اسیدی و مرغی رسام توصیه می شود.
- برای اصلاح آب های سخت و رفع گرفتگی نازل ها استفاده از سوپا لینک توصیه می شود .
- برای افزایش کارایی علف کش ها و قابلیت اختلاط کودها استفاده از سوپا لینک توصیه می شود .