

برنامه تغذیه محلول پاشی حبوبات			
ردیف	زمان مصرف	توصیه کودی	دوز مصرف
1	2 تا 3 برگی	آمینو اسید ترانوکس مگا میکس بوستر روی مولیبدن	100 تا 150 گرم در 100 لیتر آب 0.5 تا 1 کیلوگرم در هکتار 1 تا 2 لیتر در هکتار
2	5 تا 6 برگی	آمینو اسید ترانوکس آلسیگول توتال	100 تا 150 گرم تا 100 لیتر آب 5 لیتر در هکتار
3	قبل از گلدهی	کامپلت ZMC فیسکا روی بوروزینک مگازپ	0.5 تا 1 لیتر در هکتار 3 لیتر در هکتار 3 کیلوگرم در هکتار 1 تا 2 لیتر در هکتار
4	غلاف بندی	سیگو کا اکسپرس استند SKH انهنس KCS مکسی فروت سوپا کل بور	3 لیتر در هکتار 1 تا 1.5 لیتر در هکتار 2 تا 3 لیتر در هکتار 1 تا 2 لیتر در هکتار 2 تا 3 لیتر در هکتار
	توضیحات		

رسام آگری

برنامه تغذیه آبیاری حبوبات				
ردیف	زمان مصرف	توصیه کودی	دوز مصرف	توضیحات
1	قبل از کاشت	کود مرغی رسام	20 لیتر در هکتار	اصلاح و احیای خاک
2	2 تا 3 برگی	NPK 10.50.10+TE هیومیک اسید رسام	8 تا 15 کیلوگرم در هکتار 10 تا 20 لیتر در هکتار	افزایش حجم ریشه، تقویت بوته و کمک به افزایش جذب عناصر
	5 تا 6 برگی	NPK 20.20.20+TE آهن فرواکتیو الیگو اکتیو روی پلاس	8 تا 15 کیلوگرم در هکتار 2 تا 5 کیلوگرم در هکتار 1 تا 2.5 کیلوگرم در هکتار	تامین عناصر ماکرو مغذی و آهن و روی
4	قبل از گلدهی	NPK 10.50.10+TE هیومیک اسید رسام	8 تا 15 کیلوگرم در هکتار 10 تا 20 لیتر در هکتار	بهبود گلدهی، تامین انرژی برای گلدهی و افزایش جذب عناصر
5	غلاف بندی	NPK 13.8.20+1.5MgO+8CaO+TE NPK 12.12.36 مگاسید	8 تا 15 کیلوگرم در هکتار 20 تا 30 کیلوگرم در هکتار 30 تا 40 لیتر در هکتار	افزایش کیفیت، عملکرد دانه و غلاف بندی و کاهش ابتلا به بیماری

- در خاک های شور و قلیایی تکرار مصرف کود های گوگردی و هیومیک اسیدی و مرغی رسام توصیه می شود.
- برای اصلاح آب های سخت و رفع گرفتگی نازل ها استفاده از سوپا لینک توصیه می شود .
- برای افزایش کارایی علف کش ها و قابلیت اختلاط کودها استفاده از سوپا لینک توصیه می شود .

رسام آگری