

برنامه تغذیه محلول پاشی انار				
ردیف	زمان مصرف	توصیه کودی	دوز مصرف	توضیحات
1	تورم جوانه و رشد رویشی	مگاست مگازیپ	1 تا 2 کیلوگرم در هکتار 1.5 تا 2.5 لیتر در هزار	بهبود فرآیند رشد جوانه های رویشی و زایشی و پیشگیری از بیماری ها
2	قبل از گلدهی	کامپلت ZMC بوروزینک فیسکا روی سوپا کل بور	1 تا 2 لیتر در هکتار 3 کیلوگرم در هکتار 3 لیتر در هکتار 3 تا 4 لیتر در هکتار	بهبود گلدهی، قدرت تلقیح و القای مقاومت در مراحل اولیه رشد گیاه
3	آغاز تشکیل میوه	مگاسی مگامیکس بادمیت *1 انهنس KCS مگاکاپ *2	400 تا 500 گرم در هزار 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار 1.5 تا 2.5 لیتر در هکتار 2 تا 3 لیتر در هکتار 1 تا 1.5 لیتر در هزار	تشکیل میوه با کیفیت، جلوگیری از آفتاب سوختگی میوه و تقویت کننده سیستم ایمنی
4	دوران رشد میوه	آمینو اسید ترانوکس مکسی فروت سیل اکتیو سوپا کل بور	100 تا 150 گرم در 100 لیتر آب 1.5 تا 2 لیتر در هکتار 1 تا 3 لیتر در هکتار 3 تا 4 لیتر در هکتار	بهبود سایز و کیفیت میوه و افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها و آفات جلوگیری از ترک خوردگی میوه
5	آغاز تغییر رنگ میوه	سیگو کا اکسپرس Cal 52 مگاپیک	3 لیتر در هکتار 2 تا 3 لیتر در هکتار 2 تا 2.5 لیتر در هزار	بهبود رنگ گیری، تنظیم قند طبیعی میوه، افزایش سایز و انبار داری میوه و مقاومت به بیماری ها

*1: تکنولوژی منحصر به فرد SSRD به صورتی در فرمولاسیون این ترکیب طراحی شده که اشعه های مضر ماوراء بنفش و مادون قرمز را بلوکه می نماید.

*2: این محصول با تحریک سنتز فیتوالکسین و سنتز PR (یون فسفیت و کیتوزان) تقویت سیستم دفاعی گیاه را موجب شده و همچنین به عنوان منبع با دوام مس با داشتن ترکیبات میکرو و نانو کیتوزان که عامل تحریک رشد است.

برنامه تغذیه آبیاری انار			
ردیف	زمان مصرف	توصیه کودی	دوز مصرف
1	تورم جوانه و رشد رویشی	اوره فسفات هیومیک اسید مایع رسام	20 تا 30 کیلوگرم در هکتار 10 تا 20 لیتر در هکتار
2	قبل از گلدهی	NPK 10.50.10+TE	10 تا 20 کیلوگرم در هکتار
3	آغاز تشکیل میوه	NPK 20.20.20+TE آهن فرواکتیو الیگو اکتیو روی پلاس	10 تا 20 کیلوگرم در هکتار 30 تا 50 گرم برای هر درخت 1.5 تا 3.5 کیلوگرم در هکتار
4	دوران رشد میوه	NPK 12.12.36 NPK 13.8.20+1.5MgO+8CaO+TE نیتрат کلسیم	20 تا 30 کیلوگرم در هکتار 10 تا 20 کیلوگرم در هکتار 5 تا 10 کیلوگرم در هکتار
5	آغاز تغییر رنگ میوه	NPK 15.5.30+2MgO+TE سولوپتاس نیترات کلسیم	10 تا 20 کیلوگرم در هکتار 20 تا 30 کیلوگرم در هکتار 5 تا 10 کیلوگرم در هکتار

رسام آگری

- در خاک های شور و قلیایی تکرار مصرف کود های گوگردی و هیومیک اسیدی و مرغی رسام توصیه میشود.
- برای اصلاح آب های سخت و رفع گرفتگی نازل ها استفاده از سوپا لینک توصیه میشود .
- برای افزایش کارایی علف کش ها و قابلیت اختلاط کودها استفاده از سوپا لینک توصیه میشود .