



SUPA 3ZBM®

کود مایع غلیظ حاوی روی، بور و مولیبدن
جهت تامین و رفع کمبود این عناصر
(تنها ترکیب سه گانه Zn ، B & Mo بافرمولاسیون Solution)

عناصر	درصد وزنی	درصد حجمی
بور محلول	۵/۱	۶/۹
روی محلول	۴/۴	۶
مولیبدن محلول	۰/۴	۰/۵
اسیدیته	۷/۵-۸/۵	
وزن مخصوص	۱/۳۵-۱/۳۷	

مزایا:

- نسبت‌های بهینه عناصر ضروری برای بهبود رشد محصولات در مراحل خاص رشد
- بهبود دهنده گل‌دهی، گرده‌افشانی و تولید قندها
- افزایش فتوسنتز، سطح بریکس میوه و یکنواختی در اندازه میوه‌ها
- کاهش نیترات اضافی و تبدیل آن به آمینو اسید و پروتئین جهت کاهش ابتلا به آفات و بیماری‌ها
- غلظت بالا در نتیجه مصرف کمتر در هر هکتار
- سازگاری گسترده با سایر مواد شیمیایی کشاورزی
- عدم تشکیل کریستال در دماهای پایین.



Fertigation



Foliar

اهمیت روی (ZINC)

روی آنزیمی را تشکیل می‌دهد که سطح CO_2 را برای فتوسنتز حفظ می‌کند. همچنین نقش مهمی در تولید اکسین‌ها (هورمون‌های رشد گیاهی) دارد.

اهمیت بور (BORON)

بور برای حرکت قند در گیاه و همچنین تشکیل سلول‌های جدید در نقاط رشد ضروری است. این عنصر بر گرده‌افشانی و توسعه بذر نیز تأثیر می‌گذارد.

اهمیت مولیبدن (MOLYBDENUM)

مولیبدن نقش حیاتی در متابولیسم نیترات دارد و نیتروژن مورد نیاز برای تشکیل اجزای سلولی حیاتی مانند پروتئین‌ها و کلروفیل را فراهم می‌کند. تثبیت نیتروژن در حبوبات به مولیبدن وابسته است.



جدول کاربرد

محصول	محلول پاشی (لیتر/هکتار)	کوددهی خاکی (لیتر/هکتار)	تعداد و زمان مصرف
غلات و حبوبات	۲-۳	۳-۵	کاربرد در ابتدای پنجه زنی تا مرحله تشکیل ساقه
درختان دانه‌دار - هسته‌دار	۲-۳	۳-۱/۵	۳ کاربرد در مرحله ی تورم جوانه، ریزش گلبرگ و پس از تشکیل میوه
مرکبات و آووکادو	۲-۳	۳-۵	کاربرد با شروع رشد تا مرحله گلدهی (کاربرد خاکی در زمان گل توصیه می‌شود)
میوه‌جات	۱/۵-۲	۳-۴	طی دوره رشد رویشی تا از آغاز گل دهی
سبزی‌جات برگی	۱/۵-۲	۳-۴	طی دوران رشد و تکرار در صورت نیاز
گیاهان غده‌ای و ریشه‌ای	۱/۵-۲	۳-۴	پس از تشکیل سطح برگ کافی به کار رود و تکرار در صورت نیاز
انگور و توت‌ها	۲-۳	۳-۵	کاربرد با شروع رشد تا مرحله گلدهی (کاربرد خاکی در زمان گل توصیه می‌شود)

جدول کاربردی فوق جهت شرایط عادی و متعارف ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و بهبود برنامه مدیریت محصول خود با کارشناسان فنی این شرکت در تماس باشید.
در صورت محلول پاشی احتمال بروز لکه بر روی میوه و برگ‌ها وجود دارد، لذا به فاصله زمانی محلولپاشی تا برداشت توجه نمایید.

