

قارچ کش تیوفانات متیل WP70%



تیوفانات متیل کولین استراز خون را کاهش می دهد. برای اخذ نتیجه مطلوب همواره مبارزه شیمیایی را در تلفیق با روش های غیر شیمیایی و رعایت اصول به زراعی بکار گیرید.

در نظر داشته باشید که برای ضدعفونی بذر استفاده از دستگاه بوجاری به طریقه سنتی و برای محلول پاشی ابتدا سمپاش مناسب را انتخاب و کالیبره نمایید، سپس نصف منبع سمپاش را پر از آب نمایید و مقدار توصیه شده از تیوفانات متیل را درون مخزن ریخته و مابقی آب را به آن بیفزایید تا غلظت مورد نظر حاصل شود.

از مصرف مجدد ظروف خالی آفت کش برای نگهداری آب و مواد غذایی جداً خودداری نمایید، ظروف و بسته های خالی باید در یک محل دور از منابع آبی نگهداری شود و مطابق با ضوابط ملی مربوطه نسبت به دفع زیست محیطی ظروف و بسته های خالی اقدام گردد.

توضیحات تکمیلی

مزایا و نقاط قوت:

قارچ کشی سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

کنترل طیف وسیعی از عوامل بیماری زای قارچ

مومیایی درختان میوه هسته دار

پوسیدگی های میوه سیب با عامل *Gloerosporium* و *Monilia*

بیماری های ناشی از بوتراپتیس و اسکروتونیا در محصولات مختلف

لکه برگی های با عامل قارچی در چغندر، کلزا، کرفس و..

دستورالعمل مصرف:

آبیاری	محلول پاشی برگی	نوع محصول
برای ضد عفونی به نسبت ۱۵۰ گرم در ۱۰۰ کیلوگرم بذر	سیاهک	گندم
50 تا ۶۰ گرم در ۵۰ لیتر آب نزدیک طوقه درخت	پوسیدگی سفید ریشه	درختان میوه
50 تا ۶۰ گرم در ۵۰ لیتر آب نزدیک طوقه درخت	پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه	درختان میوه های سردسیری
50 تا ۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	پوسیدگی قهوه ای	هلو
50 تا ۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	لکه سیاه	سیب و گلابی
50 تا ۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	سفیدک	درختان میوه